

2016年12月21日

日本ケミファ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目2番3号

TEL:03-3863-1211(代表) / FAX:03-3864-5940

「クロピドグレル錠 25mg/75mg『ケミファ』」の 効能・効果および用法・用量の追加承認に関するお知らせ

日本ケミファは、「クロピドグレル錠 25mg/75mg『ケミファ』」(2015年6月薬価収載)について、12月21日付で下記「効能・効果」および「用法・用量」の追加が承認されましたのでお知らせいたします。

これにより、先発品と「効能・効果」、「用法・用量」が同一となりました。

◆追加承認の内容(下線部分が追加箇所)

効能・効果	用法・用量
<ul style="list-style-type: none"> ● 虚血性脳血管障害(心原性脳塞栓症を除く)後の再発抑制 	<p><虚血性脳血管障害(心原性脳塞栓症を除く)後の再発抑制の場合></p> <p>通常、成人には、クロピドグレルとして75mgを1日1回経口投与するが、年齢、体重、症状によりクロピドグレルとして50mgを1日1回経口投与する。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される下記の虚血性心疾患 <p>急性冠症候群(不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞) 安定狭心症、陳旧性心筋梗塞</p>	<p><経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患の場合></p> <p>通常、成人には、投与開始日にクロピドグレルとして300mgを1日1回経口投与し、その後、維持量として1日1回75mgを経口投与する。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成の抑制</u> 	<p><末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成の抑制の場合></p> <p><u>通常、成人には、クロピドグレルとして75mgを1日1回経口投与する。</u></p>

以上