

2017年11月15日

日本ケミファ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目2番3号

TEL:03-3863-1211(代表) / FAX:03-3864-5940

カンデサルタン錠 2mg/4mg/8mg「ケミファ」の 効能・効果および用法・用量の追加承認に関するお知らせ

日本ケミファは本日 11 月 15 日、カンデサルタン錠 2mg/4mg/8mg「ケミファ」(2014 年 12 月薬価収載)について、「効能又は効果」および「用法及び用量」の追加が承認されましたのでお知らせいたします。

これにより、先発医薬品と効能・効果、用法・用量が同一となりました。

◆追加承認後の「効能又は効果」および「用法及び用量」(下線部分が追加箇所)

効能又は効果	用法及び用量
高血圧症	通常、成人には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 4~8mg を経口投与し、必要に応じ 12mg まで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、1 日 1 回 2mg から投与を開始し、必要に応じ 8mg まで増量する。
腎実質性高血圧症	通常、成人には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 2mg から経口投与を開始し、必要に応じ 8mg まで増量する。
<u>下記の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合</u> <u>慢性心不全(軽症~中等症)</u>	<u>通常、成人には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 4mg から経口投与を開始し、必要に応じ 8mg まで増量できる。</u> <u>なお、原則として、アンジオテンシン変換酵素阻害剤以外による基礎治療は継続すること。</u>

以上